



RKZ - voorbeeld 1 beslisondersteuning in HIX

VKA advies bij intermediair bloedingsrisico en hoog trombo-embolie risico

• Type antistolling	<input checked="" type="radio"/> VKA(fenprocoumon, acenocoumarol) <input type="radio"/> VKA + TAR <input type="radio"/> TAR (ascal/plavix/brique/efient) <input type="radio"/> Anders <input type="radio"/> noac (nieuwe antistollingsmiddelen) <input type="radio"/> Stollingspoli interne
◦ Protocol manualmaster	 Overbruggingsbehandeling van ingrepen bij patiënten met orale VKA
◦ CHA2DS2-VASc (nodig bij atriumfibrileren)	 CHA2DS2-VASc score patient
• Indicatie antistollingsbeh./ Trombo-embolierisico	<3 mnd na eerste VTE
◦ Evt. 2de indicatie	
• Soort antistolling	<input checked="" type="radio"/> acenocoumarol <input type="radio"/> fenprocoumon
• Neuraxisblokkade	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> nog onbekend
◦ Zoekhulp bloedingsrisico obv ingreep	
• Bloedingsrisico	<input type="radio"/> Laag risico, streef INR 2.0-2.5 <input type="radio"/> Hoog risico, streef INR <=1.5 <input checked="" type="radio"/> Intermediair risico, streef INR <=1.5
• Beleid	Streef INR <=1.5, Stop VKA, start Bridging (Schema groep 2)
• ... dgn. preoperatief staken	3
• Herstart VKA	24 uur na ingreep
• Trombosedienst Starlet	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
• Gewicht	80,000 +- kg
• eGFR (LMWH is gecontra-indiceerd bij Innohep en eGFR<=20)	67
◦ eGFR aangevraagd	<input type="checkbox"/>
• Benodigde recepten	... 1 dd 0,7 ml innohep (geel)